

Diminuer le dépérissement de la vigne par la taille

+

quelques méthodes curatives

LA JOURNEE TECHNIQUE DU VIGNOBLE
4 mars 2026

Claire Maisonneuve – Agrobio Périgord

Le rôle de l'Esca/BDA dans le dépérissement de la vigne



- Symptômes foliaires lents ou apoplectiques → perte de rendement jusqu'à mort du cep
- Expression variable selon les cépages et les conditions climatiques
- S'accompagne toujours de nécroses internes du bois et parfois d'amadou
- Symptômes causés par une perturbation de la circulation de la sève et les toxines produites par l'amadou
- Première cause de présence de bois mort dans les ceps : taille mutilante



Règles de taille non-mutilante

Taille non mutilante : sarment de l'année

**Ne pas supprimer
l'empattement**



Trop ras




Trop long



Correct

Taille non mutilante : sarment de 2 ans et plus



L'onglet ou le « chicot » laissé doit avoir une longueur égale au diamètre du bois coupé.


Le cône de dessiccation produit pénètre peu dans le tronc.



Taille non mutilante : coupe d'une branche principale



Retrouvez les vidéos
du PNDV : Les
indispensables de
la taille vertueuse de
la vigne



$D < 2 \text{ à } 3 d$: limiter le dessèchement
 $L > 2D$





Points de vigilance sur la taille Guyot- Poussard et cordon de Royat

-

Respect des flux



Taille Guyot-Poussard de formation : choisir le bon flux




Taille Guyot-Poussard de formation : choisir le bon flux




Taille Guyot-Poussard de formation




Taille Guyot-Poussard de production





- Deux bras :
 - Un avec un courson
 - Un avec courson + baguette
- Alternier la baguette chaque année
- Mettre le courson sous la baguette



Taille Guyot-Poussard de production








Taille Guyot-Poussard de production




Flux de sève continu



Taille en cordon




Taille en cordon





Méthodes curatives

Recépage



Le recépage doit, idéalement, être effectué en plusieurs années

Curetage



Curetage





Conclusion : pratiques culturelles à privilégier

- Adapter la taille pour limiter les portes d'entrée des pathogènes,
- Mettre en place des pratiques curatives le plus tôt possible (curetage, recépage, greffage...),
- Maîtriser la vigueur de sa vigne (gestion de la fertilisation et de l'enherbement),
- Un ébourgeonnage bien mené (moins de plaies de taille occasionnées)
- Outils d'entretiens de la vigne bien réglés (moins de blessures des ceps occasionnées).

Merci de votre attention !

LA JOURNEE TECHNIQUE DU VIGNOBLE

4 mars 2026

Claire Maisonneuve – Agrobio Périgord